核准日期：2006年08月11日
修改日期：2011年01月19日
2011年10月18日
2015年12月26日
2020年10月30日
2025年04月30日

注射用水溶性维生素说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】通用名称：注射用水溶性维生素
英文名称：Water-soluble Vitamins for Injection
汉语拼音：Zhusheyong Shuirongxing Weishengsu
【成　　分】本品为复方制剂，其组份为：

硝酸硫胺（维生素B_1）	3.1mg	核黄素磷酸钠（维生素B_2）	4.9mg
烟酰胺	40mg	盐酸吡哆醇（维生素B_6）	4.9mg
泛酸钠	16mg	维生素C	116mg
生物素	0.06mg	叶酸	0.4mg
维生素B_{12}	0.005-0.005mg		

辅　　料：依地酸二钠、甘氨酸
【性　　状】本品为淡黄色的疏松块状物或粉末
【适 应 症】本品系肠外营养不可少的组成部分之一，用以满足成人和
【规　　格】复方制剂
【用法用量】静脉滴注。成人和体重10kg以上的儿童，每日一次，按每公斤体重不满
斤体重1ml（用无菌注射液10ml溶解后）。
在无菌的条件下，在配好的复方脂肪乳注射液（供成人和十一岁以上儿童使用）；
1、复方脂溶性维生素注射液（Ⅱ）（供成人和十一岁以上儿童使用）；
2、复方脂溶性维生素注射液（Ⅰ）（供十一岁以下儿童使用）；
3、脂肪乳注射液；
4、无电解质葡萄糖注射液；
5、注射用水；
用上述5种配制的混合液须加入脂肪乳注射液中再经静脉滴注；亦可以5种配制的混合液与加入
脂肪乳注射液中也可加入葡萄糖注射液中再经静脉滴注。
本品溶解后应在无菌条件下立即加入输液中，并在24小时内用完。
【不良反应】对本品中任何一种成份过敏的患者可能发生过敏反应。
【禁　　忌】对本品中任一成份有过敏史的患者禁用。
【注意事项】1、静脉注射速率过快或过量可发生恶心、呕吐、面红、发热等反应。
2、本品加入葡萄糖注射液中进行输注时，应注意避光。
【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。
【儿童用药】新生儿及体重不满10kg的儿童，同【用法用量】项。
【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。
【药物相互作用】
1、本品所含维生素B_1能降低左旋多巴的作用；
2、本品含叶酸可降低苯妥英钠的血浆浓度和抑盐类的生物利用度；
3、维生素B_{12}对大剂量羟钴胺与某些抗生素存在相互影响。
【药物过量】水溶性维生素一般不会发生过多症，即使过量服用，多余的部分也会
【药理毒理】本品是静脉营养的
进行。
【药代动力学】在体内参与酶系统的组成，
【贮　　藏】遮光，密封，在15℃以下保存。
【包　　装】低密玻璃瓶装；
【有 效 期】24个月
【执行标准】YBH03772011
【批准文号】国药准字H20083067
【药品上市许可持有人】
名称：海南皇隆制药股份有限公司
地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号
【生产企业】
企业名称：海南皇隆制药股份有限公司
生产地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号
邮政编码：570311
电话号码：0898-66341680
传真号码：0898-66341811
网　　址：http://www.hnhuanglong.com