

1992

抗酸剂对利巴韦林抗病毒作用的影响

AUC平均值下降14%。单剂量研究结果临床相关性未知。

表1慢性肝炎成纤维素服用利巴韦林后的平均药代动力学参数 (N=12)

--	--

--	--

C	(ng/ml)	783 (27)	3680 (95)
---	---------	----------	-----------

[illegible]

资产使用效率	64% (44)
--------	----------

利用主杆有两种代谢途径：(1) 一种是左右拉细

三吡嗪羧酸代谢物的代谢途径

林后, 在336小时内尿及粪便中分别有61%和12%消除, 其中未经转化的利巴韦林只占17%。

八六八

生夫及士人 魯

1101	1000W	SM	VX	200088	SM	VX	1000S1000V000000	2000S1000V000000	S1000S1000V000000	WX	AAAA
------	-------	----	----	--------	----	----	------------------	------------------	-------------------	----	------

高3倍, 较肌肝清除率值在30~60ml/min的患者A

利巴韦林。肌酐清除率

肝功能障碍。nald-puge 类为A、B、C)分别口服单剂量(60

然而平均C_{cr}值随肝功能障碍的严重而增大,患有

九科

性别：在对18个男性患者及18个女性患者进行

2000年10月1日現在、日本に居住する外国人の数は、約150万人に達している。そのうち、約100万人は、日本に定住する外国人で、約50万人は、日本に短期滞在する外国人である。このうち、約10万人は、日本に定住する外国人で、約50万人は、日本に短期滞在する外国人である。

【色 表】药品也表用复口膜；12粒盒；18粒盒
【合 盒】盒装盒
【有 效 期】24个月

【有效期】24个月

海口上世社友

地址：海南自贸港国家高新技术产业园
三横路9号

企业名称：海南皇隆制药股份有限公司

生产地址：海南省海口国家高新技术产业开发区
二横路0号

邮政编码: 570311
电话: 0898-88616868

网 址: <http://www.hnhuanglong.com>