

核准日期: 2018年02月02日
修改日期: 2018年07月30日
2018年11月16日
2019年05月14日
2019年07月13日
2020年11月20日
2021年10月26日
2025年09月24日
2025年10月24日

外



苯扎氯铵溶液

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 苯扎氯铵溶液

英文名称: Benzalkonium

汉语拼音: Benzalkonium

【成份】

本品主要成份为苯扎氯铵。化学名称: 三正丁基苄基氯化铵

【性状】

本品为无色的澄清液体, 味极苦。振摇时能产生大量泡沫。

【适应症】

用于手术部位粘膜消毒; 皮肤、黏膜、创面消毒。

【规格】

(1) 150ml: 0.15g (0.10%) (2) 0.05% (500ml: 0.25g)

【用法用量】

1. 手术部位的黏膜消毒: 0.10%~0.25% 溶液。

2. 感染皮肤消毒: 0.01% 溶液。

3. 阴道冲洗: 0.02~0.05% 溶液。

稀释方法: 高浓度品种可用生理盐水或新蒸馏水稀释至所需浓度。

【不良反应】

曾报道引起变态反应性结膜炎、视力减退、接触性皮炎, 也有报道3%溶液滴眼数分钟后引起恶心、出汗终致死亡。

【禁忌】

对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品为外用制剂, 严禁口服, 不可接触黏膜。

2. 本品直接外用, 请向医师或药师咨询, 医师或药师根据临床情况酌情使用。

3. 低温时可能出现混浊或沉淀, 可置于温水中溶解, 溶解后仍按原用法使用。

4. 在涂布黏膜或创面时, 应避开黏膜或创面, 避免直接接触黏膜或创面。

5. 不能在黏膜、创面或者炎症部位长期使用。

6. 当药品性状发生改变时禁止使用。

7. 儿童必须在成人监护下使用。

8. 请将此药品放置在儿童不能接触的地方。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

在医生指导下使用。

【儿童用药】

尚不明确。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

本品与肥皂和其他阳离子表面活性剂、枸橼酸盐、碘化物、硝酸盐、亚硝酸盐、水杨酸盐、铜盐、酒石酸盐、生物碱配伍禁忌。与铝、荧光素钠、过氧化氢、白陶土、含水羊毛脂和有些磺胺药配伍禁忌。如正在使用其他药品, 使用本品前应咨询医师或药师。

【药物过量】: 误服本品可致中毒。

【药理学】

本品为阳离子表面活性剂, 对革兰阳性细菌有杀菌作用, 对革兰阴性细菌有抑菌作用, 对真菌有杀灭作用。本品对革兰阳性细菌的杀菌作用, 是由于本品能破坏细菌的细胞膜, 使其失去完整性, 导致细胞内容物外泄, 最终导致细菌死亡。本品对革兰阴性细菌的抑菌作用, 是由于本品能破坏细菌的细胞膜, 使其失去完整性, 导致细胞内容物外泄, 最终导致细菌死亡。本品对真菌的杀灭作用, 是由于本品能破坏真菌的细胞膜, 使其失去完整性, 导致细胞内容物外泄, 最终导致真菌死亡。

本品对革兰阳性细菌的杀菌作用, 是由于本品能破坏细菌的细胞膜, 使其失去完整性, 导致细胞内容物外泄, 最终导致细菌死亡。

本品对革兰阴性细菌的抑菌作用, 是由于本品能破坏细菌的细胞膜, 使其失去完整性, 导致细胞内容物外泄, 最终导致细菌死亡。

本品对真菌的杀灭作用, 是由于本品能破坏真菌的细胞膜, 使其失去完整性, 导致细胞内容物外泄, 最终导致真菌死亡。

本品对革兰阳性细菌的杀菌作用, 是由于本品能破坏细菌的细胞膜, 使其失去完整性, 导致细胞内容物外泄, 最终导致细菌死亡。

(1) 150ml: 0.15g (0.10%); 1瓶/盒; (2) 1瓶/盒, 附医用阴道冲洗器配套使用。

(2) 0.05% (500ml: 0.25g); 1瓶/盒。

【有效期】(1) 150ml: 0.15g (0.10%); 36个月

(2) 0.05% (500ml: 0.25g); 24个月

【执行标准】(1) 150ml: 0.15g (0.10%); YB800022018

(2) 0.05% (500ml: 0.25g); YBH25612025

【批准文号】(1) 150ml: 0.15g (0.10%); 国药准字H20183002

(2) 0.05% (500ml: 0.25g); 国药准字H20258182

【药品上市许可持有人】

名称: 海南星隆制药有限公司

地址: 海南省海口市美兰区海甸街道海甸五路10号

生产地址: 海南省海口市美兰区海甸街道海甸五路10号

企业名称: 海南星隆制药有限公司

生产地址: 海南省海口市美兰区海甸街道海甸五路10号

邮政编码: 570214

电话号码: 0898-68616666

传真号码: 0898-68616666

网址: <http://www.hnhuadong.com>