铝碳酸镁咀嚼片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：铝碳酸镁咀嚼片

英文名称：Hydrotalcite Chewable Tablets

汉语拼音：Lvtansuanmei Juzhuopian

【成　　份】

本品每片含0.5克铝碳酸镁，辅料为：无水淀粉、甘露醇、甘露聚糖（140微型D）、糖精钠、薄荷素、镁、薄荷脑、香蕉味粉末香精。

【性　　状】

本品为白色或类白色片。

【作用类别】

本品为抗酸与胃黏膜保护类非处方药药品。

【适 应 症】

1. 慢性胃炎。

2. 与胃酸有关的胃部不适症状（如胃痛、胃烧灼感、反酸、嗳气、上腹胀）。

【规　　格】0.5克

【用法用量】

咀嚼后服下。一次1～2片，一日3次。餐后1～2小时、睡前或用

【不良反应】

1. 偶见便秘、稀便、口干和食欲减退。

2. 大剂量服用可导致软糊状便、大便次数增多或粪便潜血阳性。

3. 过敏反应。

【禁忌】

1. 对本品中任何成分过敏者禁用。

2. 严重肾功能不全者（肌酐清除率＜30毫升/分钟）禁用。

3. 低磷血症者禁用。

4. 病理性肌肉无力或瘫痪（重症肌无力）者禁用。

【注意事项】

1. 肾功能不全者（肌酐清除率为30～50毫升/分钟）、高钙血症及严重心功能不全者慎用。

2. 孕妇如使用本品后发生腹泻，易增加流产、早产的风险，妊娠期妇女使用本品应咨询医生。

3. 目前尚无铝碳酸镁用于儿童的安全性和有效性的资料，应在医师指导下使用。

4. 尚无儿童用药的安全性和有效性的资料，应在医师指导下使用。

5. 急腹症患者应在医师指导下使用。

6. 低磷饮食患者应在医师指导下使用。

7. 本品连续服用的疗程为2周，严重或有并发症的胃溃疡患者应遵医嘱。

重疾病（如肾衰竭、肝硬化等），应及时去医院就诊。

8. 如服用过量或出现不良反应，应立即就医。

9. 过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

13. 每日服用铝碳酸镁的患者应避免饮酒。

14. 阿尔茨海默氏病或其他类型痴呆症患者应避免高剂量或长期服用本品。

15. 肾功能损害者应避免长期服用本品，以免导致铝在体内蓄积，血清铝水平不可超过40微克/升。

甲类

【药物相互作用】

1. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

2. 应服用本品至少1小时后或在其他药物服用前2小时服用本品，以避免本品影响其他药物的吸收（如：强心苷类、四环素类、氟喹诺酮类、异烟肼类、巴比妥类、苯妥英钠、甲氧苄啶、吩噻嗪类、地高辛、华法林、双膦酸盐类、铁剂、维生素D、维生素A）。

3. 与氟化钠合用时，本品可减少氟化钠的吸收。

4. 与本二氮䓬类合用时，本品可减少后者的吸收。

5. 与异烟肼类合用时后者吸收可能延迟或减少，与左旋多巴合用时疗效可能减弱。

【药理作用】

本品有明显抗酸作用，并兼有直接黏膜保护作用，对胃酸分泌无抑制作用，其作用温和持久。

【贮　　藏】密封保存。

【包　　装】

聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔包装。1.2克/板×3板/盒；0.6克/板×6板/盒；2.4克/板×3板/盒；4.8克/板×4板/盒；4.8克/板×6板/盒；6.0克/板×4板/盒；6.0克/板×6板/盒。

【有 效 期】24个月

【执行标准】XK13-[illegible]

【上市许可持有人】

名　　称：海南[illegible]

注册地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷二横路8号

邮政编码：570311

电话号码：0898-86868368

传真号码：[illegible]

网　　址：http://www.[illegible].com

【生产企业】

企业名称：海南[illegible]

生产地址：海南省[illegible]

邮政编码：570311

电话号码：[illegible]

传真号码：[illegible]

网　　址：http://www.[illegible].com

如有问题可与生产企业联系。